

Saque de su camino a  
quien juega sucio con  
la productividad.



**COMMAND**<sup>®</sup>



**FMC**



Excelente en el control de las malezas de hojas anchas y gramíneas. Command 4 EC, el herbicida perfecto en aplicaciones pre-emergentes y post-emergentes de malezas


**COMMAND 4 EC. EL HERBICIDA AL COMANDO DE SU SIEMBRA.**

- Actúa inhibiendo la producción de pigmentos llevando las malezas a la muerte en un corto período de tiempo.
- Gran compatibilidad y acción complementaria a herbicidas pre-emergentes.

### Composición

Clomazona.....50,8% p/p EC  
 Ingredientes inertes c.s.p.....100% p/p

| Cultivo                               | Malezas controladas   | Dosis L/ha   | Observaciones   |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Tabaco                                | Ortiga, bledo, quihuilla, chamico, tomatillo.   | 1,0  | Se recomienda aplicar de preplantación, incorporado y en la preemergencia de las malezas. Mojamiento 200 L/ha. Una aplicación por temporada.  |
| Papas                                 | Pata de gallina, Hualcacho, Pega pega, Maicillo de semilla, Sanguinaria, Duraznillo, Porotillo, Hierba de la culebra, Hierba del chanco, Verdolaga, Enredadera, Lengua de gato, Crucíferas y Chamico. | Zona Norte 0,3 a 0,5 L/ha<br>Zona sur 0,2 a 0,3 L/ha | Se recomienda aplicar de preplantación, incorporado y en la preemergencia de las malezas. Mojamiento 400 L/ha. Una aplicación por temporada.  |
| Zapallo de guarda, Zapallito italiano |   | 1,5 a 1,8 L/ha                                       |   |
| Pepino                                |   | 0,8 a 1,0 L/ha                                       |   |
| Melón tuna                            |   | 0,8 a 0,9 L/ha                                       |   |
| Melón reticulado, sandía              |   | 0,5 a 0,7 L/ha                                       |   |
| Arroz                                 | Hualcacho, Pasto de la Perdiz, Hualtata.  | 0,8 - 1,0  | Aplicar con malezas pequeñas. En Hualcacho de 1 - 3 hojas. Usar la dosis mayor con malezas de 2 a 3 hojas y dosis menor con malezas recién emergidas. Volumen de agua sugerido, 200 a 400 L/ha. Una aplicación por temporada. |
| Raps                                  | Mostacilla, Calabacilla, Pasto pinito.  | 0,25   | Aplicar en preemergencia. Volumen de agua sugerido, 200 a 400 L/ha. Una aplicación por temporada.   |



### ATENCIÓN

Este producto es peligroso para la salud humana, animal y al medio ambiente. Lea toda la etiqueta antes de usar el producto y siga rigurosamente las instrucciones de ésta. Utilice siempre los equipamientos de protección individual. Nunca permita la utilización del producto por menores de edad. Haga Manejo Integrado de Plagas. Descarte correctamente los envases y restos de productos. Uso exclusivamente agrícola.

**CONSULTE SIEMPRE UN INGENIERO AGRÓNOMO.**



FMC Corporation Chile  
 Río Refugio 9663. Parque de Negocios ENEA, Pudahuel  
 Santiago, Chile - consultaschile@fmc.com  
 Tel: (56-2) - 28299800 Fax: (56-2) - 28299801

