

Pounce[®]

Siembra seguro, dile adiós a los cortadores y barrenadores.

POUNCE es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión.

POUNCE posee un amplio espectro de acción en plagas del suelo y follaje, de hortalizas y cultivos industriales.

POUNCE controla especialmente larvas de lepidópteros, coleópteros, dípteros y hemípteros en frutales, cultivos bajos y hortalizas.

POUNCE posee un largo efecto residual.

Por su naturaleza, POUNCE presenta una toxicidad muy baja para personas y animales.

SEMBRANDO Y COSECHANDO LA VIDA, *Juntos*

FMC

Pounce®

MODO DE ACCIÓN

La permetrina presente en POUNCE actúa como una neurotoxina que afecta las células nerviosas de los insectos, con un rápido efecto de volteo, causando la muerte.



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	APLICACIÓN	P.C.
Tomate	Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	65 cc/100 L de agua	Aplicar con un mojado de 200 a 800 L, según el estado de desarrollo del cultivo. Frecuencia de aplicaciones: cada 15 días. Número máximo de aplicaciones: 2 por temporada.	15 días
Repollo	Mariposa blanca de la col (<i>Pieris brassicae</i>)			
Coliflor	Gusano del choclo (<i>Heliothis zea</i>); Cuncunilla (<i>Copitarsia turbata</i>)			
Maíz	Gusano del choclo (<i>Heliothis zea</i>)	165-260*cc/ha	Frecuencia de aplicaciones: cada 15 días. Número de aplicaciones: 2 por temporada. Mojamiento mínimo maíz 300 L, remolacha mínimo 400 L.	15 días
Remolacha	Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)			
Alfafa	Cuncunilla negra de las empastadas (<i>Dalaca pallens</i>)	200-260*cc/ha	Número máximo de aplicaciones: 1 por temporada. Mojamiento mínimo de 500 L.	15 días
Trébol				
Remolacha	Langostino de la remolacha (<i>Paratanus exitiosus</i>)	200-300*cc/ha	Aplica a la base de las plantas en post-emergencia. Frecuencia de aplicaciones: cada 15 días. Número máximo de aplicaciones: 2 por temporada. Mojamiento mínimo de 400 L.	15 días
Manzanos	Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	10-20*cc/100 L de agua	Aplicar de acuerdo a los niveles de capturas de adultos con trampas de feromonas. Antes ataques muy intensos repetir cada 15 días. Número máximo de aplicaciones: 2 por temporada. Mojamiento de 1000 a 2000 L, según estado de desarrollo del fruto.	15 días
Manzanos Perales	Enrollador de los frutales (<i>Proeulia auraria</i>)			
Remolacha Frejol Maravilla Maíz	Agrotis spp. Gusano barrenador del maíz (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>)	500-600*cc/ha	Aplicar en pre siembra, incorporando con el rastraje liviano. Número máximo de aplicaciones: 1 por temporada. Mojamiento mínimo de 500 L.	15 días

APLICACIÓN:

[*] Aplicar dosis mínima y máxima de acuerdo al estado fenológico del cultivo. Aplicar dosis mínima en primera etapa del cultivo. Aplicar dosis máxima al cultivo en pleno desarrollo.

ATENCIÓN

Lea atentamente y siga rigurosamente las instrucciones contenidas en la etiqueta. Recuerde depositar los envases con triple lavado en centros de acopio.



FMC

Av. Vitacura 2670, Piso 15, Oficina 1501 Las Condes, Santiago
Tel. + 56 2 2820 4205 - consultaschile@fmc.com

VISITE NUESTRO NUEVO SITIO

www.fmcagroquimica.cl